



CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

## MATHÉMATIQUES 2

DURÉE : 4 heures

*L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée.*

Pour tout nombre entier relatif  $n \in \mathbb{Z}$ , on définit la fonction  $J_n$  de la variable réelle  $x$  par :

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(nt - x \sin t) dt .$$

(on ne cherchera pas à calculer cette intégrale)

### PARTIE I

I.1 Montrer que  $J_n$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , paire si  $n$  est pair et impaire si  $n$  est impair.

I.2 Exprimer  $J_{-n}(x)$  en fonction de  $J_n(x)$ .

On supposera dorénavant que  $n$  est un nombre entier positif ou nul.

I.3 Montrer que  $J_n$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

I.4 Montrer que l'on a  $J'_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos t \cdot [(n - x \cos t) \cos(nt - x \sin t)] dt$ .

En déduire que  $J_n$  est solution de l'équation différentielle linéaire homogène :

$$(B_n) \quad x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0 .$$

### PARTIE II

II.1 Montrer que pour tout  $p \in \mathbb{N}$  et tout  $x \in \mathbb{R}$  on a :

$$J_{2p}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos 2pt \cdot \cos(x \sin t) dt ,$$

$$J_{2p+1}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(2p+1)t \cdot \sin(x \sin t) dt .$$

**II.2** Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $J_n(x)$  est développable en série entière de  $x$  sur  $\mathbb{R}$  tout entier (on utilisera les développements en série entière des fonctions cosinus ou sinus, selon la parité de  $n$ ).

**II.3** Soit  $p$  un nombre entier naturel.

**II.3.1** Calculer l'intégrale  $\int_0^\pi \cos 2pt \cdot \sin^{2k} t \cdot dt$  pour tout nombre entier  $k$  supérieur ou égal à  $p$  (on pourra exprimer  $\sin^{2k} t$  comme combinaison linéaire des  $\cos 2qt$ , avec  $q \in \mathbb{N}$  et  $q \leq k$ ). Lorsque  $p > 0$ , montrer que cette intégrale est nulle pour tout nombre entier  $k$  tel que  $0 \leq k < p$ .

En déduire les coefficients  $\alpha_{2k}(p)$  du développement en série entière

$$J_{2p}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_{2k}(p) x^{2k} \text{ de } J_{2p} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

**II.3.2** Calculer l'intégrale  $\int_0^\pi \sin(2p+1)t \cdot \sin^{2k+1} t \cdot dt$  pour tout nombre entier  $k$  supérieur ou égal à  $p$  (on pourra exprimer  $\sin^{2k+1} t$  comme combinaison linéaire des  $\sin(2q+1)t$ , avec  $q \in \mathbb{N}$  et  $q \leq k$ ). Lorsque  $p > 0$ , montrer que cette intégrale est nulle pour tout nombre entier  $k$  tel que  $0 \leq k < p$ .

En déduire les coefficients  $\alpha_{2k+1}(p)$  du développement en série entière

$$J_{2p+1}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_{2k+1}(p) x^{2k+1} \text{ de } J_{2p+1} \text{ sur } \mathbb{R}.$$

## II.4

**II.4.1** On fixe  $x \in \mathbb{R}$ . Exprimer en fonction des valeurs des  $J_n(x)$  les coefficients de Fourier des fonctions  $\cos(x \sin t)$  et  $\sin(x \sin t)$  de la variable  $t$ . Ces deux fonctions sont-elles égales à la somme de leurs séries de Fourier ?

**II.4.2** En déduire la valeur des sommes  $J_0(x) + 2 \sum_{p=1}^{+\infty} (-1)^p J_{2p}(x)$ ,  $J_0(x) + 2 \sum_{p=1}^{+\infty} J_{2p}(x)$ ,

$$\sum_{p=1}^{+\infty} (-1)^p J_{2p+1}(x) \text{ et } J_0(x)^2 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} J_n(x)^2.$$

### **PARTIE III**

On considère l'équation différentielle linéaire homogène :

$$(B_\lambda) \quad x^2 y'' + xy' + (x^2 - \lambda^2)y = 0 .$$

où  $\lambda$  est un nombre réel donné.

#### **III.1**

**III.1.1** Montrer que, pour que  $x^\lambda z(x)$  soit solution de  $(B_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$ , il faut et il suffit que  $z$  soit solution de l'équation :

$$(B'_\lambda) \quad xz'' + (2\lambda + 1)z' + xz = 0 .$$

**III.1.2** Dans le cas où  $\lambda = -\frac{1}{2}$ , déterminer la solution générale de  $(B'_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$ , et en déduire la solution générale de  $(B_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**III.1.3** En déduire la solution générale de  $(B'_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$  lorsque  $\lambda = \frac{1}{2}$ .

On se propose à présent de chercher les solutions de  $(B_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$  de la forme  $y(x) = x^\lambda z(x)$ , où  $z(x)$  est la somme d'une série entière.

**III.2** On cherche les solutions de  $(B'_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$  de la forme  $z(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ .

**III.2.1** Etablir la relation qui doit exister pour tout  $k \geq 1$  entre  $a_{k+1}$  et  $a_{k-1}$  pour que  $z$  soit solution de  $(B'_\lambda)$ .

On suppose dorénavant que  $\lambda$  n'est pas un entier strictement négatif.

**III.2.2** Montrer qu'il existe une unique solution  $z_\lambda$  de  $(B'_\lambda)$  de la forme

$z_\lambda(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p}(\lambda)x^{2p}$ , et telle que  $a_0(\lambda) = 1$ . Calculer  $a_{2p}(\lambda)$  pour tout  $p \in \mathbb{N}$ . Quel est le

rayon de convergence de la série entière  $\sum a_{2p}(\lambda)x^{2p}$  ?

**III.3** On définit sur  $]0, +\infty[$  la fonction  $j_\lambda$  par  $j_\lambda(x) = x^\lambda z_\lambda(x)$ .

**III.3.1** On suppose que  $\lambda$  n'est pas un nombre entier.

Montrer que les fonctions  $j_\lambda$  et  $j_{-\lambda}$  sont linéairement indépendantes.

En déduire la solution générale de  $(B_\lambda)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**III.3.2** Soit  $n$  un nombre entier strictement positif.

Comparer  $j_n$  à la fonction  $J_n$  définie au début du problème.

Vérifier que la fonction  $z_{-n}$  définie par  $z_{-n}(x) = x^{2n} z_n(x)$  est solution de l'équation  $(B'_{-n})$ .

**Fin de l'énoncé**